

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

PROVEEDOR: UPL AGRO S. A. DE C. V.

Datos Generales del Producto

Producto	CAUTELA
Nombre común	Mancozeb + Carbendazim
Nombre químico	Mancozeb: Complejo polimérico de manganeso etilen bis (ditiocarbamato) con sal de zinc Carbendazim: Metilbenzimidazol-2-ilcarbamato
Concentración	Mancozeb: 63.00% Equivalente a 630 g de i.a. / Kg Carbendazim: 12.00% Equivalente a 120 g de i.a. / Kg
Tipo de formulación	Polvo Humectable
Función	Fungicida Agrícola
Grupo químico	Mancozeb: Carbamatos Carbendazim: Benzimidazoles
Modo de acción	Mancozeb: Contacto, multisitio. Carbendazim: Sistémico con acción protectante y curativa.
Registro	RSCO-MEZC-FUNG-1354-X0015-002-075
Precauciones especiales	Nocivo si se inhala

Usos

CAUTELA es una mezcla de fungicidas formulado como polvo humectable para el control de las siguientes plagas en los cultivos de:

Cultivos	Enfermedad		Dosis kg/ha	Recomendaciones
	Nombre común	Nombre científico		
Chile, Berenjena, Jitomate, Tomate de cáscara, Papa, (5)	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	2.5 - 3.0	Se recomienda realizar dos aplicaciones, dirigidas al follaje, a intervalos de 7 días; volumen de aplicación es de 280 - 380 L de agua/ha

Melón, Sandía, Calabaza, Calabacita, Pepino, (5)	Antracnosis	<i>Collectotrichum lagenarium</i>	2.0- 3.0	Se recomienda realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días; volumen de aplicación es de 370 - 470 L de agua/ha
Crisantemo (SL)	Mancha foliar Botrytis	<i>Cercospora chrysanthemi</i> <i>Botrytis cinerea</i>	0.35-0.50 kg/ 100 L de agua	Se recomienda realizar una aplicación al follaje.
() Intervalo de Seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de haber aplicado el producto.				

Método para preparar y aplicar el producto

Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de CAUTELA siempre utilice el equipo de protección personal. Evite el contacto con la mezcla tanto al momento de la preparación como de la aplicación. Para aplicaciones terrestres puede utilizarse distintos equipos dependiendo de las condiciones físicas de la parcela y estado de desarrollo del cultivo. Se recomienda utilizar una aspersora motorizada, acondicionada con una boquilla de cono, previamente calibrada.

Signos y síntomas de intoxicación

En caso de ingestión puede causar náuseas, vómito, dolor estomacal, temblores, espasmos y debilidad. En caso de contacto con la piel puede causar erupciones, adormecimiento, ardor y hormigueo; en caso de que entre en contacto con los ojos puede causar enrojecimiento. En caso de inhalación puede causar náuseas, mareos, vómitos, debilitamiento muscular, dificultades respiratorias, taquicardia, sudor excesivo, sangrado de la nariz, temblores y convulsiones.

Tratamiento y antídoto específico

No hay antídoto específico. Se recomienda dar tratamiento sintomático y de sostén.