

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-HEDE-0201N-301-002-080

1. GENERALIDADES

REGIMENT® es un herbicida preparado como polvo humectable, sistémico en su modo de acción y recomendado para el control de malezas de hoja angosta (zacates) que afectan la productividad del cultivo de arroz.

Un sinónimo de este herbicida se conoce con la marca comercial VELOCITY.

2. COMPOSICIÓN PORCENTUAL

		% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:		
<i>bispiribac - sodium</i>	NO MENOS DE	80.00%
2,6-bis [(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]benzoato sódico]. (Equivalente a 800 g. / Kg.)		
INGREDIENTES INERTES:	NO MÁS DE	20.00%
Surfactante		
	TOTAL	100.00%

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS

Nombre común (ingrediente activo) Bispyribac – sodium.	Categoría toxicológica 4
Grupo químico Pirimidinil carboxi.	Fitotoxicidad A las dosis recomendadas no es fitotóxico al cultivo de arroz. No debe mezclarse con Propanil.
Nombre químico [Sodium 2, 6-bis [(4, 6-dimethoxypyrimidin-2-yl) oxy]benzoate.	Efectos adversos Ninguno detectado
Valent de México S.A. de C.V. / Av. Vallarta 6503 G-8 Col. Cd. Granja C.P. 45060 / Tel: (33) 31 10 01 62 IDEAS & TECNOLOGÍA PARA CULTIVOS QUE 	

Formulación Polvo humectable.	Contraindicaciones Ninguna
Concentración 800 g/kg	Incompatibilidad No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. No debe mezclarse con Propanil.

4.a RECOMENDACIONES PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

REGIMENT® es un herbicida de aplicación post emergente al cultivo y a la maleza.

Las aplicaciones deberán efectuarse usando tanta agua como sea necesaria para lograr el cubrimiento completo del follaje, según se emplee equipo de aspersión por vía aérea o terrestre.

REGIMENT® debe ser aplicado en mezcla con Kinetic a razón de 125 ml por cada 100 litros de agua y realizar **dos** aplicaciones en el ciclo de cultivo.

- La primera aplicación a los 15 días después de la emergencia del arroz, cuando haya desarrollado de 5 a 6 hojas y un macollo que tenga una altura de 18 a 23 centímetros; cuando las malezas dominantes tengan de 2 a 6 hojas y una altura entre 8 y 23 centímetros.
- La segunda aplicación se debe hacer a los 30 días después de la emergencia del cultivo.

REGIMENT® controla las malezas siguientes: gramíneas, cyperáceas, commelináceas y algunas de hoja ancha. El control de las malezas se inicia a los seis días de la aplicación y la muerte de ellas a los 14 días después de la aplicación.

4.b RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS gm/ Ha
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
ARROZ	COQUILLO	<i>Cyperus iria</i>	27.5 – 37.5
	ZACATE DE AGUA	<i>Echinochloa colona</i>	

TIEMPO DE REENTRADA AL ÁREA TRATADA

24 horas.

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

En caso de requerir servicio de información toxicológica puede llamar a (SINTOX) de AMIFAC a los siguientes teléfonos las 24 horas del día.

En área metropolitana de la Ciudad de México:

(55) 5598 6659 y 5611 2634

Desde el interior de la República Mexicana:

01 800 00928 00

Mayor información:

Valent de México S.A. de C.V.

Av. Vallarta 6503 G-8 Col. Cd. Granja

C.P. 45010

Tel: (33) 31 10 01 62